

1. Embarazo en la adolescencia.

Se llama embarazo adolescente aquel que se produce entre los 10 y 19 años.

Algunos factores de riesgo cuando se tiene un embarazo no deseado son:

- ✓ Abandono escolar.
- ✓ Bajo autoestima.
- ✓ Abuso de sustancias.




El embarazo adolescente contribuye a la mortalidad materna e infantil debido a las complicaciones en el parto y durante el embarazo.



SESIÓN 7: “CONOCE TUS EMOCIONES Y EVITA CONDUCTAS DE RIESGO”


Consecuencias del embarazo adolescente

Escolares y emocionales	Sociales y económicas
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Deserción escolar. ✓ Rompimiento del proyecto de vida. ✓ Tendencia a la delincuencia. ✓ Alteración emocional. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Conflictos familiares. ✓ Abandono de la pareja. ✓ Problemas para obtener empleo. ✓ Carencia de un ingreso monetario.



2. Prevención de infecciones de Transmisión sexual (ITS).

Las infecciones de transmisión sexual (ITS) se producen por bacterias, virus y hongos.



Algunos de los síntomas generales de las ITS son:

- ✓ Picazón y flujo vaginal.
- ✓ Secreción en el pene.
- ✓ Dolor durante las relaciones sexuales.
- ✓ Llagas en zona genital o en la boca.



Las personas con más de una ITS son parte de una cadena de transmisión.

Para prevenir las ITS es necesario abstenerse de tener relaciones sexuales, mantener una relación solo con una pareja, así como evitar las relaciones sexuales con nuevos compañeros, de igual forma vacunarse antes de iniciar la vida sexual y finalmente usar condón de manera correcta y constante.

